



HERBICIDA

GRUPO B

CLORIMURON 75 FENDER

GRÁNULOS DISPERSABLES

COMPOSICIÓN QUIMICA

clorimurón etil: etil 2[(((4-cloro-6-metoxipirimidin-2-il)amino)carbonil) amino)sulfonil]benzoato.....	75 g
inertes y coadyuvantes c.s.p.....	100 g

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA con el Nro.: 37.952

Lote Nro.:

Contenido Neto:

Fecha de Vencimiento:

Industria: China

NO INFLAMABLE



PRO CROP S.A.

Juan B Justo 757 – Planta Alta – Oficina 5
X5220ABA - Jesús María – Córdoba – Argentina
TE. +54 9 3525 626684

NOTA: No estando ni el almacenamiento ni su aplicación bajo el control de nuestra firma, no nos responsabilizamos ante daños de ningún tipo por el uso distinto al indicado en esta etiqueta.



CUIDADO



HERBICIDA

GRUPO B

CLORIMURON 75 FENDER

GRÁNULOS DISPERSABLES

PRECAUCIONES:

- **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- **INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS**
- **EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.**
- **EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.**
- **PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.**

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: No poner al alcance de los niños. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa ya que puede causar irritación. Evitar respirar la neblina de la pulverización. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua y consultar a un medico si persiste la irritación. Lavar las partes expuestas del cuerpo al producto luego del manipuleo, así como la ropa utilizada.

RIESGOS AMBIENTALES: ABEJAS: Ligeramente tóxico. Evitar su aplicación durante la época de floración. Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de tratamiento por un período prudencial. No asperjar sobre colmenares en actividad. Si no puede trasladarlos, tapar la entrada de la piquera durante la aplicación con arpillera húmeda o espuma de goma. Asperjar durante la mañana o noche, fuera del horarios de pecoreo de las abejas. **AVES:** Prácticamente no tóxico. **PECES:** Prácticamente no tóxico.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALADOS DE APLICACIÓN: Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se puede volver a aplicar este nuevo preparado sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas, alejado de centros poblados y zonas de tránsito frecuente de personas.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Inutilizar las bolsas y envases de papel perforándolos y evitando dañar la etiqueta. Los envases y bolsas perforados deben colocarse en contenedores para ser enviados a una planta especializada para su destrucción final. No enterrar ni quemar a cielo abierto los envases y demás desechos. Las cajas de cartón del embalaje se pueden quemar o depositar junto a residuos comunes, siempre que no hayan sufrido derrames de producto.

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar seguro, fresco, seco y al resguardo de la luz solar, ubicado fuera del alcance de personas



HERBICIDA

GRUPO B

CLORIMURON 75 FENDER

GRÁNULOS DISPERSABLES

inexpertas y animales. No transportar ni almacenar con alimentos, fertilizantes, otros plaguicidas y semillas. Evitar almacenar a temperaturas por encima de 35 °C.

DERRAMES: En caso de que el producto sea derramado, barrer los gránulos y disponer en tambores para su destrucción en sitios autorizados. No usar agua.

Cubrir los derrames del caldo de aplicación con material absorbente (tierra o arena).

Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación, acudir inmediatamente al médico.

Inhalación: Trasladar a la persona al aire fresco. Si no respira, suministrar respiración artificial, preferentemente boca a boca.

Ingestión: No provocar el vómito. Si la persona vomita estando inconsciente póngalo de costado con la cabeza más baja que el cuerpo. Urgente traslado a centro asistencial. Nunca suministrar nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente.

Contacto dermal: Quitar la ropa contaminada. Lavar el área afectada con abundante agua y jabón.

Contacto ocular: Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos como mínimo, o con suero fisiológico, desde el ángulo interno del ojo hacia fuera. Remover lentes de contacto si hubiera. Luego control por oftalmólogo.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:

PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CLASE III).

IRRITACIÓN OCULAR: MODERADO IRRITANTE (CUIDADO) CATEGORÍA III: Causa irritación moderada a los ojos. No irritante dermal. No sensibilizante. Aplicar tratamiento sintomático.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Molestias, vómitos, debilitamiento muscular, dificultades respiratorias, taquicardia, sudor excesivo.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.

CONSULTAS POR INTOXICACIONES: Capital Federal: Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247 Conmutador: 4962-9280 / 9212, Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín - , Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806, BUENOS AIRES: Haedo, Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777, Conmutador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03). CORDOBA: Hospital de Niños: Corrientes 643 Tel: (0351) 421-5303. ROSARIO: Hospital de Niños de Rosario Tel: (0341) 430-3533



HERBICIDA

GRUPO B

CLORIMURON 75 FENDER

GRÁNULOS DISPERSABLES

ó 481-3611/3612. **T.A.S. CASAFE** (0341) 448-0077 ó 424-2727. **MENDOZA:** Hospital Central Tel: (0261) 423-4913.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No se conocen antecedentes de potenciación, adición o sinergismo.



HERBICIDA

GRUPO B

CLORIMURON 75 FENDER

GRÁNULOS DISPERSABLES

RECOMENDACIONES DE USO

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: es un herbicida post-emergente para el control de malezas de hoja ancha detalladas más adelante en cultivos de soja y en pasturas consociadas perennes. El producto aplicado es rápidamente absorbido por raíces y follaje, traslocándose por toda la planta. Las malezas susceptibles cesan su crecimiento casi inmediatamente después de realizado el tratamiento. Las hojas se vuelven cloróticas en 3 a 5 días y se produce necrosis en los puntos de crecimiento. La muerte ocurre 7 a 21 días después de su aplicación.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

PREPARACIÓN: Para preparar el producto se aconseja seguir los siguientes pasos:

- Cargar con agua el tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su capacidad.
- Con agitación agregar la cantidad requerida.
- Agregar la cantidad necesaria de surfactante no iónico.
- Completar las cargas de agua en el tanque.
- Agitar mediante el retorno de la bomba hasta lograr una suspensión homogénea.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:

Puede ser aplicado con avión y con equipo terrestre de arrastre o autopropulsados.

Aplicación terrestre: Aplicar un caudal de 100 a 130 litros de agua por hectárea. La presión debe ser de 80 a 100 libras/pulg² (5,5 a 7 bares). Para conseguir una buena cobertura de malezas, se recomienda que la barra esté provista de picos de abanico plano, la máquina correctamente calibrada.

Aplicación aérea: Usar boquillas que provean una óptima distribución de las gotas y máxima cobertura con un caudal de 30-40 litros de agua por hectárea.

Usar como mínimo 30 litros de agua por hectárea. Con alta densidad de malezas o follaje denso aumentar el volumen.

No aplicar con inversión térmica, con vientos fuertes o arranchados, u otras condiciones que puedan perjudicar la cobertura o alcanzar cultivos no deseados.

RECOMENDACIONES DE USO

Asperjar observando las siguientes recomendaciones:

- Después que todas las malezas hayan emergido.
- Cuando las malezas son jóvenes de (3 a 5 hojas) y en activo crecimiento.
- El efecto será reducido si las malezas se encuentran en estado de estrés por falta de lluvia.

No debe llover dentro de las 4 horas posteriores a la aplicación.

No se debe escardillar el cultivo hasta 5 días después de realizada la aplicación.



HERBICIDA

GRUPO B

CLORIMURON 75 FENDER

GRÁNULOS DISPERSABLES

Cultivo	Maleza	Dosis	Momento de Aplicación
Pasturas	<p>Falsa biznaga (<i>Ammi majus</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Manzanilla (<i>Matricaria chamomilla</i>) Manzanilla cimarrona (<i>Anthemis cotula</i>) Mastuerzo (<i>Coronopus didymus</i>) Mostacilla (<i>Myagrum rugosum</i>) Nabillo (<i>Sisymbrium irio</i>) Nabo (<i>Brassica campestris</i>) Nabón (<i>Raphanus sativus</i>) Ortiga (<i>Urtica urens</i>) Ortiga mansa (<i>Lamium amplexicaule</i>)</p>	7 á 10 g/ha	<p>Aplicar en postemergencia de las malezas y de la pastura.</p> <p>Aplicar desde que la maleza tiene 3 hojas trifoliadas y las gramíneas 3 hojas verdaderas.</p> <p>La máxima eficacia se logra aplicando cuando las malezas son pequeñas y están en activo crecimiento.</p> <p>Recomendado para pasturas consociadas perennes de alfalfa, cebadilla, falaris, festuca, pasto ovillo, raigrás y trébol blanco.</p>
Soja	<p>Abrojo grande (<i>Xanthium cavanillesii</i>) Chamico (<i>Datura ferox</i>) Chinchilla (<i>Tagete bonariensis</i>) Nabo (<i>Brassica campestris</i>) Saetilla (<i>Bidens pilosa</i>) Yuyo colorado (<i>Amaranthus quitensis</i>)</p>	13 á 20 g/ha	<p>Aplicar en postemergencia de las malezas y de la soja.</p> <p>Para lograr la máxima eficacia se debe efectuar el tratamiento cuando las malezas se encuentran en activo crecimiento (2 a 5 hojas).</p> <p>A la dosis más alta es posible que se produzca clorosis o retardo temporario del crecimiento, que no afectará el rendimiento de la soja.</p>
	<p>Bejucos (<i>Ipomoea spp.</i>)</p>	13 á 20 g/ha + 50 cm ³ /ha de 2,4 DB 100%	
	<p>Malva cimarrona (<i>Anoda cristata</i>)</p>	13 á 20 g/ha + 18g/ha de flumesulam 80 WG	

Use solamente surfactantes no iónicos con un contenido mínimo de 50% de ingrediente activo. Evite usar productos que no definan claramente su composición en la etiqueta.



HERBICIDA

GRUPO B

CLORIMURON 75 FENDER

GRÁNULOS DISPERSABLES

RESTRICCIONES DE USO:

Periodo de carencia en soja 60 días. En caso de las pasturas dejar transcurrir entre el pastoreo o cosecha de las mismas al menos 30 días.

Reingresar al área tratada una vez que el producto se haya secado completamente de las hojas.

“En caso que el cultivo o sus sub-productos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia”.

No aplicar en lotes donde dentro de los 9 meses siguientes al tratamiento se prevea la siembra de sorgo, girasol, arroz o maní. Ya que podrán ser dañados por residuos remanentes del producto.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con otros herbicidas o productos que no estén expresamente indicados, ya que puede haber reducción de la actividad del herbicida o daño al cultivo.

Para mayor seguridad se recomienda hacer ensayos en pequeña escala. Se debe testear la compatibilidad con otros agroquímicos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico si se usa según lo indicado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.